






STEP	SKÆRMBILLEDE
<p>Log in som "Kommunulækna umsitari"</p>	
<p>Vælg Systemadministration og Fraseditor i menupunkterne</p>	
<p>Vælg den enhed fraserne skal være/er tilknyttet</p>	
<p>Der ses nu en oversigt over de fraser som, som er tilgængelige</p> <p>For at gøre en ny frase, tryk på "Ny frase" nederst i hjørnet</p>	 <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Test 8.1.1.14_004P</p>


Skriv frasen og tryk **Gem**

Mellemrum må ikke bruges i feltet **Erstat.*** - ellers virker frasen ikke

Der anbefales kun at bruge små bokstaver





For at prøve frasen tryk **Prøv**



Nu er muligt at teste om frasen virker.

I demoen, skrives ko og siden trykkes på **Enter**

og sidenhen ses frasen



Hvis brug er for det, kan indsættes **stoptegn**. Der kan sættes flere stoptegn ind, men det må gøres mens fraser bliver gjort.

Stoptegn gør, at musen stopper inde i teksten, hvor stoptegnet er og skrives kan tekst eller tal midt i frasen. teksten.

Muligt er at hoppe til næste stoptegn ved at trykke på **"Tab"**

Editor/tilføj frase: _____

Erstat:*

tíð

Med:*

sj. skal hava tíð aftur til kontroll innan ½ ár og skal hava tikið blóðroynd _._ vikur áðrenn kontrolltíð.]

Undersøgelse af fraser

sj. skal hava tíð aftur til kontroll innan ½ ár og skal hava tikið blóðroynd _._ vikur áðrenn kontro

Symptomer: (hoste,hvæsen, dyspnøe, natlig opv
Dagsymptomer pr. uge._.
Natsymptomer pr. uge._.
Begrænsninger i fysisk aktivitet._.
Forværringer pr år._.)

Når fraserne er lagt ind på enheden, som de skal bruges, er det klart at bruge.

Fraseditor

Fraser for arbejdsenheden: Læknarnir í Miðlon

Søgning: _____

Alle fraser:

Fraser	Erstattes med	Stopmærke
d	Dosisdispensering	_.
ko	kommunulækni	_.
læ	læknaváttan send til Almannaverkið	_.
s	sendast	_.
sr	sendast við rutuni	_.
symp	Symptomer: (hoste,hvæsen, dyspnøe, natlig opvDagsymptomer pr. uge._Natsymptomer p...	_.
tíð	sj. skal hava tíð aftur til kontroll innan ½ ár og skal hava tikið blóðroynd _._ vikur áðrenn kont...	_.
tj	Tjaldurs apotek	_.