

# Krabbameinsútgreining

## Illgruni um lungnakrabba

### Sjúkueyðkenni, ið geva illgruna um lungnakrabba

Við niðanfyrir nevndu sjúkueyðkennum hjá persónum eldri enn 40 ár við viðkomandi tubbaksnýtslu er viðkomandi at senda ávísing til krabbaútgreining fyrri illgruna um lungnakrabba

- Hosti í meira enn 4-6 vikur hjá einum lungnafrískum persóni
- Broytingar í hostimynstrinum hjá persóni við kroniskum bronkitti
- Nýtilkomin andaneyð við hartilhoyrandi óvanligari spirometri uttan aðra upplagda frágreiðing
- Hemoptysa (óansæð aldur og tubbaksnýtslu)
- Meira andaneyð enn vanligt hjá sjúklingi við KOL
- Ógreið pína í bróstkassanum
- Afturvendandi lungnabruni
- B-symptomir

Persónar, ið hava verið hásir í meira enn 3-4 vikur uttan onnur sjúkueyðkenni, skulu útgreinast fyrri lungnakrabba. Men eiga fyrst at verða kannaðir av serlækna í ONH um illgruni er um laryncancer

### Absolut indikatióin fyrri útgreining fyrri lungnakrabba

Tað áliggur altíð at ávísa sjúklingin til krabbaútgreining, um minst ein av niðanfyrir nevndu fortreytum er lokin

- Tá ein myndagreining (CT-/røntgen-kanning) vísir illgrunasama lungnaígerð ella ífyllu í mediastinum
- Um illkynjað biopsi bendir á uppruna í lungunum
- Sera greið sjúkueyðkenni, ið benda á lungnakrabba - hetta hóast nýggj røntgenkanning av bróstkassa, verður lýst sum normal.

### Handfaring av recidiv

- Í eftirlitstíðarskeiðinum: Vísa til uppfylgjandi deild
- Eftir eftirlitstíðarskeiðið: Vísa til viðkomandi kannandi deild til meting av tørvi á nýggjari kanning

### Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrýmilin "Illgruni um lungnakrabba" undir móttakandi eindini "Krabbaútgreining" í Cosmic. Lys støðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m. Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bíleggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.