

Krabbameinsútgreining

Illgruni um lívmóðurkrabba

Sjúkueyðkenni, ið geva illgruna um lívmóðurkrabba

Um hesi sjúkueyðkenni eru tilstaðar skal ávísast til krabbameinsútgreining

- Vaginal bløðing byrjað > 1 ár eftir seinastu menstruatión (postmenopausal bløðing) ella óvanligar viðvarðandi bløðingar í perimenopausuni.

Skal kannast/spyrjast um

- Bløðingsanamnesu
 - Undirlívskanning
 - Palpatión av abdomen
- Spyrja um forsøgu við myom

Serligt fyrvirni eigur at vera til kvinnur, ið eru fongdar við arvaligari dispositión til tjúkktaarmskrabba (HNPCC), yvirvekt, hypertensjón og til bróstkrabbasjúklingar í tamoxifen viðgerð.

Handfaring av residiv

- Í uppfylggingartíðarskeiðnum: Ávísing sendast til gynekologiskt ambulatorium
- Eftir uppfylggingartíðarskeiðið: Nýggi ávísing sendast til krabbameinsútgreining

Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrýmilin "Illgruni um lívmóðurkrabba" undir móttakandi eindini "Krabbaútgreining" í Cosmic. Lýs støðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m. Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bíleggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.

Útgáva januar 2026