

## Krabbameinsútgreining

### Illgruni um krabbamein í tjúkk- og endatarmi

#### Sjúkueyðkenni, ið geva illgruna um tjúkk- og endatarmskrabba

- Bløðing frá endatarmi uttan aðra upplagda orsök
- Broytt opningsmynstur í > 4 vikur
- Nýliga íkomin búkpína, sum hevur vart > 4 vikur
- Bløðings- ella jarnmangulanæmi uttan aðra upplagda orsök

Eitt ella fleiri av omanfyri nevndu sjúkuteknum ella kliniskum funnum eigur, serliga hjá sjúklingum > 40 ár, at viðføra:

- Palpatiión av abdomen
- Rektal eksploratiión
- Blóðroyndir við atliti til anæmi
- Undirlívskanning hjá kvinnum

Listin omanfyri er vegleiðandi og ikki fullfíggaður. Nakrir sjúklingar við tarmkrabba hava eisini almenn sjúkutekin sum vekttað, møði v.m.

Í summum førum kemur tarmkrabbi akutt til sjóndar við ileus, perforatiión, bløðing og líknandi. Tá skal sjúklingurin innleggjast akutt.

Metastasar frá tarmkrabba geva sjáldan sjúkueyðkenni og verða ofta eyðmerktar, tá útgreinað verður fyri krabba uttan fokus ella ísv. uppfylgning fyri krabba.

#### Ávísing til krabbameinsútgreining

Um eingin onnur greið orsök er til nevndu sjúkutekin omanfyri, skal sjúklingurin ávísast við illgruna um tarmkrabba. Sjúklingar < 40 ár við kendari arvaligari dispositiión til tarmkrabba, eiga at hava serligt uppmerksemi

#### Handfaring av recidiv ella progressiión

Í uppfylggingartíðarskeiðnum: Um sjúkueyðkenni til recidiv ella progressiión vísa seg, skal vísast til deildina við ábyrgd av sjúkugongdini hjá sjúklinginum.

Eftir uppfylggingartíðarskeiðið: Um illgruni er um recidiv skal ávísast av nýggjum við illgruna um krabbamein í tjúkk- ella endatarmi.

#### Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrýmilin "Illgruni um krabba í tjúkk- og endatarmi" undir móttakandi eindini

"Krabbaútgreining" í Cosmic. Lýs støðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m.

Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bíleggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.