

Krabbameinsútgreining

Illgruni um eggjastokkakrabbamein

Sjúkueyðkenni, ið geva illgruna um eggjastokkakrabba

Um kvinna hefur hesi sjúkueyðkenni (ofta 3-5 sjúkueyðkenni gjøgnum 4-6 mánaðir)

- Búkurin vaksín/ífylla (útspílað abdomen)
- Tyngdarkenslu í undirlívinum
- Pínu í búkinum/undirlívinum
- Vætu í búkholuni (ascites)
- Versnaðan matarhug/kvalmu
- Títtari vatnlát
- Forstoppilsi
- Møði
- Andaneyð
- Blóðtøpp í beini

Skal lækni útinna/kanna:

- Undirlívskanning
- Palpatiión av abdomen
- CA125 (tumormarkørur, ið er hækkaður hjá 70-75% av kvinnum við krabbamein í eggjastokkum)
Spurja um ættarbrögði til krabba

Um onnur orsök ikki kann staðfestast til sjúkueyðkenni, skal ávísast til krabbameinsútgreining.

Handfaring av recidiv

- Í uppfylggingartíðarskeiðnum: Ávísing sendast til gynekologískt ambulatorium
- Eftir uppfylggingartíðarskeiðið: Nýggj ávísing sendast til krabbameinsútgreining

Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrýmilin "Illgruni um eggjastokkakrabba" undir móttakandi eindini

"Krabbaútgreining" í Cosmic. Lýs støðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m.

Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bíleggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.